

AUGUSTINI FRIDERICI WALTHERI M. D.

Anat: et Chir: in Academia LIPSIENSI PROF. PUBL.

D E

LINGUA HUMANA

Novis, inventis octo Sublingualibus salivæ rivis,

Nunc ex suis Fontibus

Glandulis Sublingualibus eductis,

Irrigua Exercitatio.

Accedunt

ANONYMI EPISTOLA

DE

Sublingualibus Salivæ Ductibus.

Et

A. F. WALTHERI

Additamenta ad Observationes de Ductibus
Salivalibus Sublingualium Glandularum &c.

*Editio nova, Figuris Æneis adornata,
Seduloque recognita.*



H A R L E M I,

Apud ISAACUM van der VINNE, Bibliopolam:

CIDIDCCXLV.

RECEIVED



Ductus qui in ore salivam fundunt, cum cavum subeunt, arctis admodum exiguisque orificiis stillant, in vivis exitum salivæ sua angustia temperant, et in cadaveribus visui pene se subducunt: maximi sunt, qui intra glandulas, Parotidas dictas, exiguis sparsisque radicibus nascuntur, ut harum multiplici congressu coalituque, truncus fiat insignis, qui in utroque latere exsurgit. Hic primum e medio fere glandulæ erumpit, inde super masseterem muscolum, nec ita multo post, super buccinatorum fertur, tandemque in oris cavo definit. Ipsum glandulæ corpus, sicubi in adultis duos digitos cum una alteraque linea altum longumque reperitur, tum maxima latitudine, quæ crassitie sex lineis maior est, digitum cum sex fere lineis conficere solet. Ad hæc glandula tenuem lobum sæpe porriget, qui ductum excretorium, quantumque digiti et quatuor linearum longitudine, involvit, eundemque nudum in anteriori masseteris musculi latere relin-

Parotidis descriptio.

2 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

relinquit. Ita ductus transversosuper musculum itinere fertur, eoque sub tertia ipsius altitudinis parte relicto, declivis quodammodo factus, intus versus buccinatorem musculum novem fere lineis flectitur porrigiturque, et tandem ori inferitur. Est vero non una in omnibus subiectis aut parotidis, aut eius ductus magnitudo. Sed præter diversam hominum formam, ætatemque, vitæ quoque genus, pluresque inæqualitatis causæ sunt, quæ iam carnes, iam glandulas, iam alias partes præ cæteris insignes reddidere, et ipsa natura, sæpe varias suppeditasse hominibus partium formas, creditur. Externa sua superficie parotis, e minoribus lobis coalitis, compactum refert corpus, quod superius, et propre aurem latius crassiusque; tenuius vero inferiori sui parte existit. Forma ad ovalem, at depressam quodammodo accedit. Si maceretur, levi operâ in perexiguos lobos dividitur, qui arteriis annexi sæpiusque his cincti et irretiti, apparent. Hos lobos longe magis ab arteriis quam a venis comprehendendi tum inprimis conspicitur cum utriusque generis vasa materia ceracea

racea, diverso colore tincta repleta fuerint. Quæ arteriæ, etsi valde exiguæ sunt, lobosque, quos dixi, altius subeunt, quam ut sensu eas prosequi liceat, nihilominus permultas, tandem in ductus secretorii definere initia, tanto certius iudicatur, quo magis ductus secretorii rami, qui minimis arteriis proximi habentur, si pariter cera repleti fuerint ipsorum vasorum dictorum focii conspiciuntur. Sed maior longe est arteriarum intra glandulam repentium numerus, quam venarum, quæ inde reflectuntur, et simili cum prioribus fato terminoque, sanguinem a secretionem residuum hauriunt revehuntque. Non vero solum rami, qui ad excretorium ductum spectant, sed pariter venæ arteriæque varie mutuoque sibi implicatæ, et denique cuncta multis modis convoluta et sibi connexa, ipsam corporis substantiam efformant, quæ, si tactu exploretur, inter carneam membranaceamque mollitiem fere media est, ac glandulosa audit, talis vero a vasculosa proprie dicta, tanquam laxiore quadam compage prorsus distinguitur. Quæ sicuti in quovis exiguorum loborum, experimento divul-

4 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

forum se ita habent, ita in maioribus, ubi propriis pedunculis lobi sibi invicem connectuntur, arteriæ venæque, cum suis comitibus ductus secretorii propaginibus, magis in sensus incurrun-
t; tamen et eadem experimenta abunde probant arteriarum et in hac glandula esse plures, quam venas. Quod si enim oculis armatis intuemur exiguos istos, in quos glandula ita dispescitur, lobos, certe arteriis irretitos ac colore competente perfusos cernimus, secus atque de venis meris comperimus. Sed plures esse arteriarum anastomoses iudico, venarum perpaucas. Quibus ipsis illarum augetur numerus, et ad secernendum dispositio fit, quæ eadem structura in aliis quoque humani corporis glandulis observatur. His adeo comprehenduntur, quæ parotidicum pluribus glandulis, quas conglomeratas nominant, communia existunt. Iam equidem discrimen apponere proximum esset, et talia constructionis argumenta, quæ efficiant ut is præcise succus, nec alius, e parotide promanet. At enim vero huius rei plures suppeditari posse causas, quam ut eadem hic exponi pro dignitate pos-

possint, existimo. Namque huc faciunt, et organi fecernentis a corde distantia situsque, et vasorum ingredientium organorumque integrorum mutua proportio, ortaue hinc diversa in ramos divisio, tubulorum pariter intus natorum numerus et flectendi finientique modus, totus denique omnium progressus, et longe plura, quæ, ut diversa fecernantur fluida, multum conferunt. Quæ cuncta aut sensibus detegi, aut ratione æstimari adeo nequeunt, ut penitus perspici, et intime pernosci et definiri plene valeant. Interim ex structura et compagine situque, quandam instituere comparationem fatius duco, quam efficere plane nullam. Inprimis vero de parotide similibusque glandulis nosse interest, crassum ne præ aliis inde proveniat fluidum, an vero magis dilutum reliquis. Ipsam vero salivam, cum aliis corporis humani laticibus comparatam, crassioris consistentiæ et tenacitatis esse deprehendimus, quæ magis fluida futura erat, si parotis partium vicinarum calore magis foveretur, altiusque in corpore humano recondideretur. Ad hæc per canalem satis amplum lon-

6 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

gumve, minusque munitum, saliva fertur, et insuper per ostium, quod oblique ori inferitur, exiguumque est, ori infunditur. Namque salivæ ductus proxime, ubi ex parte crassiore glandulæ proficiscitur, amplissimus præ reliquo suo tractu existit: mox vero super buccinatore musculo cum fertur, declivis quodammodo fit, posteaque, ubi ad os flectitur, protinus arctus evadit, maximeque contrahitur, cum musculum perforat, orisque integumenta, tandemque obliquo ingressu in ore hiat. Cisternam hic ductus quodammodo referre videtur, quod propter angustum adeo exitum, plus salivæ in se contineat, quam simul uno quasi impetu reddere valet, unde semper aliquid remanet, quod promere queat. Inter manducandum vero ubi fortius comprimitur concutiturque a massetere et buccinatore musculis, aut ab aliis qui maxillam commovent, maiorem quodammodo ac cum motu proprio proportionatam salivæ copiam effundit; quam non levem agitatorum musculorum vim motumque ut commode sustineat, tantam nactus est firmitatem taleque robur, ut tactui renita-

tur,

tur, albidusque ac robustus appareat, nervumque fortem, linguæ maximo non dissimilem, repræsentet.

Tenuioris autem longeque diversæ texturæ ductus sunt, qui e glandulis, quæ maxillis inferioribus apponuntur, suboriuntur, atque per intervallum plane notabile, trium circiter digitorum et quarundam linearum longitudine affurgunt, et iuxta linguæ frenum excurrunt. Truncus utrinque ex altis primum radicibus, intra glandulam actis, similique modo collectis, ac antea de parotidum ductu monui, e sua glandula emergit: tum vero haud angustior, atque ille parotidum ductus, prorumpit; nec prius coarctatur, quam cum duas tertias, itineris sui, partes confecit. Hic vero ductus super lobo, quem maxillaris glandula ad sublingualem protendit, ascendit, indeque glandulæ sublingualis corpus attingit, cui protinus, ad semissem circiter ipse implantatur, et ferme per reliquam eius longitudinem inseritur. Quanquam enim prope finem suum, tandem sublingualem glandulam relinquit, vix tamen sub integumento sublinguali, maiori, quam unius aut alterius lineæ spatio,

Glandula
Maxillaris
cum suo
ductu excre-
torio

inde recedit et in arcum flectitur; mox vero recurvus factus, super infimo linguae integumento ita emergit, ut extra hanc sub forma papillae, quasi, exspatietur nonnihil, tandemque retro et ad freni lingualis finem excurrat. Exiguum hic patet orificium, ita orificio Warthoniani ductus coniunctum, ut in unum cum illa papillam coëat, quæ a Warthoniano ductu nomen inter artis Professores obtinet. Præter vero ea quæ iam de hoc ductu attuli, mollibus quoque interiacet contegiturque muscularis, atque membranis, laxiusve cum iis componitur. Linguae hinc motum ita sequi videtur, ut, pro creberrimo huius motu, iuvari cum secretionem in glandula, tum excretionem e ductu colligere liceat. Unde experimur, si lingua levatur, quod tanquam e fonte quodam, inde saliva sæpius profiliat. Et fane in esurientibus, præcipue notatur, quod humidi portio non exigua brevi tempore in os effundatur. Ne tamen minus mihi, partium situm comparanti, superest dubium, an parotis an vero maxillaris glandula, crebrius ad eructandam salivam impellatur convellaturque. Namque et glandula

max

maxillaris corpus a connexo stringenteque musculo digastrico toties concutitur, quoties mandibulæ a se mutuo diducuntur, cum et musculus mylohyoides eidem adhæreat eamque fucutiat, una cum stylohyoideo et stylopharyngeo pluribusque ossis bicornis linguæque musculis, qui dum linguam trahunt torquentque, aut glandulam solam, aut ductum excretorium, aut denique utraque permultis modis vel elevant, vel deprimunt, vel aliter impellunt, unde si crebrior hæc concussio fit, et intra hanc glandulam tantum auget secretionem, quantum magnitudine a parotide differt, tum non minor salivæ quantitas per ductus Warthonianos eructabitur, quam per Stenonianos. Ad ipsum vero quod attinet corpus, id a parte qua laryngem spectat, valida nerveaque cingitur tunica, quæ firmum glandulæ ligamentum suppeditat, quo maxillæ inferiori musculoque pterygoideo externo annectitur, ad usque reliquam sui partem superiorem, ubi tenuiori ac celluloso magis velo obducitur, et mylohyoideo; a latere vero digastrico musculis, et ante dictis a processu styliformi ortis

tegatur, et iis adhæret. Eius tunicæ annectitur et nervus, et arteria venaque lingualis, et inferius appendet aliarum glandularum minorum una alterave, quæ in iugulo magis constituantur, et pro lymphæ receptaculis conglobatæ reputantur. Super musculum mylohyoideum, lobum glandula nostra porrigit, ante a me notatum, qui in acumen definit, et cum confimili, a glandula sublinguali demisso, arcte committitur. Interim integra glandulæ longitudo, cum iam nominato lobo, aut processu, qui in lingua adulti sæpe digito quatuorque lineis protenditur, tres fere digitos in sectione exhibuit. Tum vero glandulæ corpus sesqui digiti altitudinem retulit, nec latitudo corporis iam dictæ quantitate maior, nec quoque crassities una alteraque linea digito minor fuit. Cæterum in eadem glandula idem quod in parotide, obtinuit, ut in lobos minores processusque exiguos, si macerata ante fuerit dissolvi possit. E cuncta quæ de vasorum tubulorumque plexu occasione parotidis docui, hic quoque annotari debent.

*Glandula
Sublingualis.*

Sed ad tertium genus glandularum

m

me converto, quod æque, ac ante dicta, salivam reddit, quamquam viæ atque ductus, per quos ista in cavum oris effunditur, nondum penitus Anatomicis ante hac innotuerunt. Quorum quidem gratia potius hæc scribenda suscepi, quam ut plura de ante allatis pervulgatisque proponerem. Nihilominus tamen accurate nosse, per multum interest, quem locum situmque hæ glandulæ, quarum altera in utroque latere posita est obtineant. Hæc a linguæ freno porrigi incipit, et anteriori maximaque latitudine, quandoque digitum cum aliquot lineis conficit, quandoque aliquot lineis digito minor habetur, tegit musculum genioglossum, inde vero ad latus fertur, nec exiguam ceratoglossi portionem attingit; hinc flectitur versus maxillarem glandulam deprimiturquê, ubi minus lata crassaque altero extremo facta, tandem in lobum aut processum terminatus, illi similem, in quem maxillaris definit. Et inter hos lobos, ita nexos, assurgit ille Warthoni ductus, et per superiorem glandulæ sublingualis partem transit. Cæterum hæc eadem ubi crassissima est, vix unquam sua mole

le plus cinque lineis habet. At in longum ita porrigitur, ut duos sæpe digitos cum aliquot lineis ad usque lobum absolvat. Sed nosse pariter expedit modum, quo hæc in viventibus sub lingua promineat, et ipsis oculis nostris videndam se præbeat. Cum os aperitur, linguaque levatur, et quodammodo flectitur, tunc hæ glandulæ utrinque, quem occupent situm, visu pariter et tactu explorari potest. Lingua igitur his tanquam pulvinaribus mobilibus flexilibusque superincumbit. Et hæ eadem cuniculorum instar, sub ea protuberant, et utrinque linea recta iuxta linguæ latus excurrunt, ad medium quasi mentum iuxta frenum protensæ. Tum vero hi monticuli, vel elati magis, vel depressi extant, cum linguæ apex reclinatur, aut in longum protenditur. Quas glandularum prominentias lineasque, quæ fere in angulum iuxta infimum linguæ frenum definunt, sedulo iam notari cupio, ideo, quod in his cruribus detecta fuerint, quæ nunc commemorari debent. Quæ ita dehiscunt, a se invicem linguæ promontoria, ipsam intermediumque eius frenum excipiunt, et sinum pro linguæ

guæ situ varium producant, magnitudine vero formaque sua, et tractu a supra dictis glandulis differunt. Ipsa vero earum compages non aequè a traditis recedere censetur, ut dissimilem, quem praeferant usum, ipsis decernere liceat. Potius earum externa facies, artificiosa in lobos divisio, vasorumque cognitio, et denique plura, quae ad omnium inter se cognationem faciunt, satis confirmant, pari secretioni haec ultima prodesse organa, atque illa, quae supra recensui. Suo namque humore salivali rigantur, quae laudavi promontoria, perpetuoque madent, et digitis pressa, aut fortius lingua protracta, non obscurum profilientis vestigium suppeditant. Proinde tanta tamque insignis est glandula, ut utili non minus officio destinetur, quam omnis glandula, quod ex penitiorè earum cognitione colligitur.

Nihil vero magis ad huius veram cognitionem pertinet, quam ut ex anatome detegantur viæ ductusque qui huic glandulae proprii censentur, secretionemque salivam in cavum oris immittunt. Namque huic inprimis, praeteritoque seculo reservatum fuisse videtur,

*Glandulae
Sublingualis
excretio quomodo in brutis per unicum perficitur ductum, et qui Autores eum invenerint.*

videtur, ut invenirentur salivæ fontes, quorum vestigia, si usquam apud veteres occurrant, incerto venarum nomine istos comprehensos potius, quam recte descriptos fuisse, auctorum lectio probat. Quantumvis enim alii Hippocratis, et eius discipulorum scientiam medicam collaudent, et ipsi, quæ nostra colitur ætate, nullo habito discrimine, præferant, id omne tamen ad industriam practicam, et factas sedulo de morbis observationes potius referri, ipsisque iure deberi, pronuntiare fatius duco, quam oculatissimorum Anatomicorum nostri temporis scientiam, physicæ mechanicæque peritiam, plurimumque doctrinæ medicæ partium culturam, multis studiis et impensis, laboribus denique ac tempore perfectam, cum ista quam ante dixi ætate comparare. Atque sic præterito demum seculo *Stenonis* et *Wartboni* industria inventi fuerunt ductus, quorum alterum e maxillari glandula oriri, utrumque vero salivam fundere, supra declaravi. Quæ laudatorum virorum industria, non ita multo post medicum solertissimum doctissimumque *Aug. Quirin. Rivinum*, et *Casparum*

parum Bartholinum impulit, ut glandulæ a linguæ freno statim excurrentis vsum, humorisque ibi secreti exitum, propriumque eius in ore ductum in brutis explorarent. Hi quemadmodum primi fuerunt, qui de inventionis gloria certare possunt, ita cum anatomicorum nemo post hos eundem in hominibus accurata et delineatione, et descriptione, protulerit, a re alienum non esse duxi, ut, quod reliquum est perficere allaborem. Quidquid autem isti observarunt, omne in animalibus brutis subsistit: nam nullum in eorum scriptis extat vestigium, quod unquam in cadavere humano idemprehenderint. Inter istos vero primum esse inventorem Rivinum patet ex Corollario, quod dissertationi de Dyspepsia Anno 1679. a Respondente adiectum fuit hisce concepto verbis: "Ductus Salivales, quos in capite vitulino" præterita hyeme aliquoties demonstra-
vit Dn. Præses, merenter illis annu-
merari, quos *Warthonus* et *Steno* an-
notarunt. Oriuntur autem ex anteri-
oribus glandulis sublingualibus, in qua-
rum substantia radices agunt, pergunt-
que supra Warthonianos immediate,"
ita,

ita, ut his caute separatis conspici-
antur illico, donec una cum illis e-
grediantur ex iisdem papillulis.. Di-
versa tamen sunt ostiola, in quorum
interiora si stylus aut flatus immitta-
tur ad glandulas maiores sublinguales
per ductum Warthoni penetrat; hic
vero a latere alii adstant pori, qui et
stylum et flatum in glandulas mino-
res sublinguales deducunt; adeoque
nullo modo hi ductus cum illis com-
municant, sed omnino singulares sunt.
Cum hac observatione convenit, quam
Bartholinus postea prodidit Tract. de
Ductu Salivali hactenus non descripto,
edito Ultraiecti Anno 1685. ubi ita lo-
quitur: „Duobus a Stenone et Wartho-
no inventis vasis salivalibus, eiusdem
plane generis addi debet, iam primum
quantum ego scio a me descriptum et
delineatum, quodque inferius dici
meretur, quippe a glandula sublingu-
ali ortum, Warthoni ductum comi-
tatur, et sub lingua, eodem, quo
Warthonianus loco aperitur, ostio æ-
que manifesto. Glandulam quidem
a qua tertium hoc vas originem re-
petit Stenonius de glandulis oris, et
sublingualem nominat, sed illi imme-
rito

glandulæ glomeraminibus ortis compositum truncum, qui ductu recto comitatur illum alterum Warthonianum, et intra gingivas in maxillæ inferioris extremitate, inter papillas quasdam compressas et rigidas, maxillæ pertinaciter adhærentes, in os aperitur., Observat præterea in ore terminari huiusmodi ductum sub lingua, in ipsis illis papillis, in inferiore maxilla conspicuis, eo in loco, iuxta quem simili modo, et eadem papilla, ductus Warthonianus ostium hiat. Ac porro cuiuslibet ductus orificium in urso utrinque prope frenulum sua extare papilla, eminere commemorat. De Leæ pariter narrat, similiter locari hæc orificia papillasque; ita tamen, quasi peculiare quoddam frenulum habeant, a tunica oris interiore effectum. Tantus est qui in brutis inuentus fuit ductus, ut neque amplitudine neque præstantia Warthoniano multum cedere putetur. Id enim non minus, ac Warthonianus intra suam glandulam in minores dispergitur ramos, et munus peculiar

atque communis vasis excretorii, egregie explet.

Sed ab hac observatione in brutis facta, alii postea inferendi occasionem nacti fuerunt, ut similem quoque in sublinguali glandula humana haberi ductum, non satis tuto conicerent. Est tamen hæc opinio pervulgata, ac ab anatomicis recepta, ut, præter *Stenonem*, *Verheyenum*, atque *Morgagnum*, vix detur, qui aliter sentiat. Istos omnes in opinione confirmavit, quod ductus Parotidis et maxillaris glandulæ, primum quidem a Stenone et Warthono in brutis demonstrati fuerint, postea ab aliis Anatomicis in humanis glandulis istis similes levi opera exhibiti sint. At cum anatomicorum alii inquirerent in verum insertionis in ore humano locum, tum non æque facile, ac in brutis, eiusmodi ductum inveniri, agnoverunt. Nihilominus similitudine, ante dicta, decepti, alii crediderunt ipsum cum Wartho- niano congruere, antequam hic promi- net, papillamque format; alii intra papillam distincto orificio aperiri ex-

*Inde alii in
homine si-
milem repe-
riri falso
intulerunt.*

istimarunt; alii vero ad papillæ marginem tale orificium extare opinati fuerunt. Nemo ad hæc usque tempora aut acie visus, aut experimentis suffultus, certi quid hac de re statuit, ac delineatum dedit, quo ab aliis quoque in humanis cadaveribus, inveniri posset.

Recensentur qui per plures ductus sublingualis glandulæ absolute excretionem crediderunt.

Inter hos, qui aliquid memoratū dignum de huius glandulæ pluribus ductibus in medium protulerunt, primus fuit *Nic. Steno*, qui, ut olim *Sylvius* in buccis iuxta gingivarum radices, orificia ductuum exiguorum observaverat, et iuxta gingivarum latera interna esse similia glandularum sublingualium orificia, annotavit, quæ excretioni destinantur. Ita vero iste loquitur *Tract. de glandulis oris*: “Tertio loco Sublinguales se offerunt, quæ utrinque ad linguæ latera sitæ eiusdem generis cum proximè præcidentibus sunt, nisi quod vasa excretoria obtinuerint, non quidem breviora, sed angustiora. Oriuntur intra ipsam exilibus rivulis, et hinc sibi invicem parallela, a lingua versus gingivas recedunt, ubi ad

ad digiti fere a dentibus distantiam“
 vix conspicuis, nisi premantur, os-“
 tiis per tunicam hiant. Nullæ os-“
 tiis, nisi ad aliquod intervallum,“
 protuberantiæ adfunt, sed, ut in“
 buccæ vasis dictum, ubicunque vas-“
 cula prædicta tunicam penetrant, i-“
 bi æqualis est, et plana. An in“
 papillis etiam sinuli adsint, non li-“
 cuit observare, compressi aliquot,“
 sed nihil expressi; hinc resectas ex-“
 aminando, vidi glandulosa frustula“
 esse, quæ reliquas supereminentia“
 tunicam ibi loci in acumen elevant.“
 Quid de his ductibus *Verheyenus* et
Morgagnus statuunt, videre est e se-
 quentibus *Morgagni*, quæ Adversa-
 rio VI. profert, verbis: „Contra
 vero cum idem *Verheyenus* in vas-“
 culorum glandularum sublingualium“
 descriptione, Stenonis, cuius no-“
 men reticet, iis verbis utitur; sibi“
 invicem parallela a lingua versus gin-“
 givas recedunt, ubi ad digiti fere“
 a dentibus distantiam vix conspicuis,“
 nisi premantur, ostiis per tunicam“
 hiant; etsi *Steno* neque cum hæc“
 scripsit, neque alio in opusculo,“

cum iterum de iisdem vasculis verba fecit, brutorum anatomen indicans, usquam hominem diserte memoravit; imo Iconismum qui ad bruta manifeste pertinet, adiecit; nemo tamen credat *Verbeyenum* quæ humanæ fabricæ repugnent, proposuisse. Quod eo magis monendum censeo, quo plures video; qui sublingualium hominis glandularum vascula, vel iuxta maxillarium ductuum ostia, vel, quod *Cowperus* ipse tradit, per hæc eadem exonerari, doceant. Namque ut id interdum, aut ex aliqua saltem parte observari, non negem; illud tamen certissime scio, me non modo frustra maxillarium ductus aliquando aperuisse, si forte aliquod eiusmodi vasculum in ipsos influens comperirem; sed multoties complura utrinque vascula inter se parallela conspexisse, et anatomicis præsertim Venetis ostendisse, quæ ab exterioribus sublingualium glandularum lateribus, non antrorsum, sed in transversum recta gingivas versus tendebant, et non magno a glandulis intervallo peculiaribus.

liari quodque osculo hiabant, per“
quod sæpius tenuiores fetus eo ma-
iori voluptate immisi, quod apud“
Stenonem legeram, hæc vasa ne“
quidem in boum genere fetam facile“
recipere. Quæ cum Nuckius ne-“
que describat, neque delineet, per“
eum poteras quem modo memora-“
bam, Iconismum Stenonis exhibe-“
re.,,

Paucis vero quid de his sentiam
expedire quoque mihi liceat. Est
aliquod spatium inter glandulam sub-
lingualem utramque atque gingivas,
quo tractu sub oris integumento com-
muni prominent orbiculi, aut glan-
dulæ dispersæ. Hoc spatium ob
profundum magis sublingualium glan-
dularum situm amplius est in brutis
quam in hominibus. In utrisque
vero glandularum ita dispersarum a-
liquæ, brevissima via, ductuque, in
oris quasi plano, exiguo ostio hiant,
aliæ, potius ad gingivas reclinantur,
cum continuato quodammodo ductu,
quo orificiis desinunt. Quandoque
in hominibus ad unam alteramque li-
neam flatu hos primum distendere,

*Quantum
bi a veris
aberrave-
rint expo-
nitur.*

postea seta explorare mihi licuit. In vitulis vero plures detexi, et sæpe ultra dimidii digiti profunditatem setam ductibus immisi. Sed in his, aliisque brutis, et ipsis quoque hominibus, ubi unquam deprehendere licet huius generis ductus, horum nullum setam intra vicinam sublingualem glandulam, alteque linguam versus admittere, abunde comperi. Quo diversarum adeo glandularum ductuumque discrimine observato, porro tractus maxillæ inferioris inferre videtur, ut earum glandularum, quas iam protuli, et in ore inferius dispersas vocavi, quæve maxillæ proximæ sunt, tubulos suos excretorios, vel singulos, vel plurium coalitu factos, ac fere parallelos, ad gingivas porrigant, orificiisque terminentur, sicuti *Steno* id fieri solum in brutis delineavit. Sed et glandulæ hæ earumque ductus, buccalibus ab ipso notatis, per omnia similes censentur. Cum talibus itaque et minoris notæ ductibus *Steno* confundit eos, qui ex insignibus sublingualibus originem trahunt glandulis. *Steno-*
nem

nem autem, quem iam *Bartholinus* confutavit, sequi nihilo minus videtur *Verheyenus*; Et nec ipse *Cl. Morgagnus* ab isto recedit. Ego vero ductus veros excretorios sublingualium glandularum, non quidem a latere harum externo, sed interno, et protinus e lingua ortos, et ad mediam porrectos glandulam, demonstrare adnitar, quorum orificia hiant, non circa gingivas, sed in opposito glandulae prominentis latere, quod internum est, linguaeque proximum, atque porro. hos ductus excretorios, amplitudine ac longitudine istis maiores, suoque ordine egregio numeroque conspicuos, aperto experimentorum testimonio, alte subire glandulam, et eidem immergi, pluribus ostendam. Unde clare patebit, *Stenonis* anatomen a glandulis humanis alienam esse, et veros sublingualium glandularum ductus, ad praesens usque tempus anatomicorum oculorum effugere aciem. Plurium anatomicorum turbam in scenam non producam, ideo, quod ad duas classes omnes referri posse, iam ante

B 5

indi-

26 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

indicaverim ; cum aut unum , ut in brutis ; aut plures excretorios ductus sublingualis glandulæ supposuerint .

*Verorum
glandulæ
ductuum la-
teralium o-
lim inve-
niendorum
impedimen-
ta.*

Commodum ergo est , ut propriis meis observationibus innixus , accuratius , quam hactenus anatomici egerunt , describam , proprium et anteriorem glandulæ sublingualis ductum , et simul plures excernendi munere functos , producam . Hos distincte proferre ideo constitui , quod eorum primus , Warthoniano proximus , cum hoc facile confudi possit , et quod e re ducam , exemplum unius e numero a me demum inventorum proferre , quem alte intra glandulam profecutus fui . Ex comparatis ante anatomicorum observationibus , et variis de ductu sublinguali opinionibus , facile colligitur , ductuum istorum vix unum in homine ab ullo repertum , aut recte demonstratum fuisse , dubiamque hactenus et incertam remansisse huius glandulæ excretionem veram , sicut præter ante dicta apparet ex iis , quæ profert *Nuckius* in *Sialographia* . Et certe
est

difficilis anterioris per fetam flatumque inventio, sed longe difficilior a Warthoniano separatio, quo distinctus in conspectum prodeat. De quibus et aliis anterioris excretorii ductus conditionibus, cum fileant, quotquot ego legi, scriptores, qui quandam de excretionem e glandula mentionem faciunt, eosdem potius hariolatos fuisse, quam certum aliquid tradidisse, ego arbitrari ausim. Hi si forte duplicem fetam papillæ Warthonianæ immiserunt, non penitus ipsis constitit, utrum in sublinguali, an vero in Warthoniano inflexo, aut bifido aut feta pertuso, alterutra fetarum hæserit, sicuti ex iam dicendis pluribus elucescet. Ante hos quatuordecim annos, cum anatomen ego, duce *Ruyfchio*, Amstelodami colerem, eandem fovi opinionem, quam pluribus placere ante monui, salivam scilicet in glandula sublinguali secretam, infundi in ductum Warthonianum; suadet id notanda Warthoniani ductus magnitudo, et huius in sublingualem glandulam transitus. Ad quæ accedebat,

28 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

bat, quod aliæ salivæ istius viæ, tum mihi minus paterent. Postea vero, cum praxin in hac urbe exercerem, mihiq̃ue sectiones pauperum demortuorum quandoque instituendi se offerret occasio, linguas quas potui examinavi. Hinc in ductum sublingualē, qui ex brutis mihi notus erat, ac si cum Warthoniano una papilla hiaret, inquisivi; Is labor nonnunquam ita cessit, ut etiam flatum ad sublingualis glandulæ corpus manifeste adegerim; Alio iterum conatu, Warthonianum ductum a glandula sublinguali caute separavi, eundemque elevavi, ut emergentis forte sublingualis ductus aliquod vestigium reperirem: Iam omni industria, microscopio quoque adhibito, utriusque unionem pervestigare suscepi. Quandoque ipsam incidi sublingualē glandulam, ut proprium ductum aut eius radices detegerem; Alio tempore, vel flatum, vel liquorem tinctum, vel ceram in Warthonianum immisi; sed nil horum ad glandulam sublingualē pervenire sensi; Nec tamen valvulas, quæ forte ingressum

in sublinguales præcluderent, temere supponere volui, quin potius alias quærere vias apud me constitui, quæ a Warthonianis recederent. Cum vero experimenta non contemnenda, hypothese minus responderent, laborisque tæderet, utpote qui toties repetitus, frustraneus censebatur, ductus a latere linguæ et a papilla distantes, quærere malui. Res voto respondit, et cum in utroque latere, trium circiter linearum a freno distantia, ductum invenissem, qui flatum immissum, ad sublingualis glandulæ usque corpus reciperet, rectoque itinere, conspicuoque progressu, mearet, me invenisse in homine verum illum, quem ante sæpius frustra quæsiveram ductum, existimavi, id solum metui, ut tantis glandulis hi ductus sufficerent. Interim de novo linguam e cadavere excidi, et iuxta papillam Warthonianam, setam ad decem fere lineas forte et feliciter intrusi, verum sic protinus subsistebat, nec altius sicut illa, quam in ductum Warthonianum inferui, moveri poterat. Distinctum inde u-

tri-

triusque canalis orificium, cum cernerem, flatumque per unum paululum diductum adigerem, hoc ipso quodammodo agitari sublingualem sensi. Ex quibus inter se comparatis aliisque inde a me observatis, iudicavi, excretorios ductus proprios, et a Warthonianis distinctos, sublinguales glandulas sibi equidem vindicare; at vero naturam in eorum situ variare, et quandoque ampliores iuxta papillas hiare, quandoque vero plures, longiore a freno distantia, in ore aperiri.

*Anterioris
novorum-
que duct-
uum glan-
dulae sub-
lingualis
primi, in-
ventionis
historia et
profunda
intra glan-
dulam in-
vestigatio
exempli lo-
co sequenti-
bus inservi-
ens.*

At anno præterito, cum munus Professoris Anatomæ et Chirurgiæ a *Rego Poloniarum Potentissimo* mihi in hac Academia concrederetur, aliquot mensium spatio post, permultorum cadaverum mihi facta fuit copia, quorum linguas cum glandulis musculisque, pariter et larynge laryngeque connexis, accuratius examinare constitui. Namque dignum Anatomico opus censebam, partem præstantem nexu, tantoque rerum memorabilium numero, et elegantia conspicuam, diligenter perlustrare

quod

quod plura nondum ab aliis penitus ac fatis explorata perspicerem, quibus nec mea opera non aliquid lucis addi posse credebam. Inter cadavera aliquod foeminæ lue venerea confectæ, e Nosocomio in Theatrum anatomicum afferebatur. Huius linguam cum supra dictis, connexisque, e cadavere excidi, et ut glandulæ integræ, ductusque salvi permanerent, sedulo curavi. Tubulos adhibui tenuissimos quibus pro vasis lymphaticis, mercurio replendis, uti soleo, quo ductus explorarem sublinguales laterales, quos quodammodo iam ante cognoveram, ut de eorum numero certi aliquid statuere possem. Atque horum unum alterumque postquam invenissem, dum anteriores exquirerem, ut curiositati meæ, si fieri id posset, tandem satisfacerem, iterum prioribus vestigiis inhæsi. Hinc papillam Warthoniani ductus sum aggreffus et primum mercurio totum replevi ductum, postea vero sublingualem vicinum forte inveniendum, mentem oculosque figens, flatum iuxta papillæ ambitum diu fatis urfi, donec

donec ductum tanquam e puncto in vicinia emergere, flatumque profundius duci, quodammodo experirer. Mox tubulum qui puncto conveniebat, applicavi, et per eundum nondum profunditate, quæ lineæ æqualis esset, illatum, mercurium inieci, quem prompte largiterque ac subito intrare percipiebam. Nec tamen, qui iam ante Warthoniano comprehendebatur mercurius, minimum aut agitabatur, aut movebatur, aut aliter immutabatur. Neque minori labore eundem in latere opposito consequabar ductum, cui postea fetam, quæ conveniebat, immisi. Utriusque orificia angusta, intervallo lineæ circiter a papilla remota, cum observassem, inde in promptu esse causam indicavi, quare hi ab anatomicis vix in homine detecti, et a Warthonianis distincti, pariterque demonstrati haftenus fuerint. Sed ad illum revertor ductum, quem ante præter Warthonianum mercurio sub lingua repleveram. Ut enim eo certius utrumque prosequerer, et Warthoniano istius lateris, et novo sublin-

linguali, præterquam, quod mercurio iam pleni essent, insuper fetam nigricantem immisi. Sed inde inventum ductum, quem nondum omni exceptione maiorem iudicabam; sed necessum tum arbitrabar, ut idem ab adversa glandulæ parte, et ubi genioglossæ ac ceratoglossæ musculo hæc contegitur, exploraretur, quo tandem, tanquam verus atque distinctus ductus, publice demonstraretur. Quamobrem infimum integumentum, quod emergentem intra fauces linguam, ipsamque glandulam sublingualem quodammodo et tegit, et vincit, cultro separavi. Hinc inferius glandulam ductuumque Wartonii, ita a membranis connexis liberavi, ut melius in conspectum prodirent. Prodit ergo hic ductus uti supra monui, primum e glandula maxillari acclivis, postea obliquo itinere versus sublingualem fertur. Utramque proinde, et sublingualem et maxillarem glandulam, a musculis aliisque, figillatim vero sublingualem, ab oris integumento, ad exiguum usque a papilla distantiam, caute

C

te

te separavi, et versus linguæ axi
 reclinavi Tab. I. Fig. I. C. ita ve
 ro superior et quæ alias lingua con
 tegi solet, sublingualis glandula, in
 conspectum venit. Sed hæc velut
 sacco proprio aut tunica cellulosa
 membraneaue, quam quoque ve
 næ perreptant, illa parte compre
 henditur: hinc eam auferre, glan
 dulamque amplius denudare, e
 visum fuit. Tum vero intra tenu
 em membranofumque Warthonia
 ductus E. contextum transparuit me
 curius, quo refertus fuit, argente
 amque retulit columnam, sublingu
 lis corpori, uti supra dixi, insister
 tem et egregie conspicuam. Unam
 ac indivisam, in reclinata ita, den
 dataque glandula, hanc apparuit
 columnam profiteor. Proinde hæc
 comprehendendi duos ductus diverso
 nondum perspexi: Propendebat a
 tem in sublinguali glandula, ab ip
 Warthoni ductu exiguum tuberc
 lum quod protinus cum isto coalesce
 re videbatur, Fig. I. spatium B
 comprehensum, nec nisi portione
 quandam glandulæ exiguam, tan
 qua

quam intra angulum isti facculo et Warthoniano ductui interpositam, admittebat. Quæ quidem mercurius, pondere suo gravis, discernebat. Porro ante dictarum fetarum unam folamque in hoc concedere quasi diverticulum observabam; Sublingualem igitur ductum subire Warthonianum existimare cœpi; Sed mea quoque in hac re me fefellit opinio. Cum enim altius inquirerem, tarda operatione et modica vi, istum. ceu ductum peculiarem, a Warthoniano divelli posse, animadverti. In quo proinde utroque, mercurio repleto; coalitis, firmiterque innexis, prorsus separandis, omnem operam collocavi. Ex voto cedebat labor, ac qui a Warthoniano distinctus prorsus est, glandulæ sublingualis ductus, provenit. Namque ad decem fere linearum longitudinem, versus papillam a se mutuo segregavi, ut integer salvusque uterque permanferit, ac mercurium in se continuerit. Ex quo ea quæ antea una, simplex apparuit columna, iam duplex apparuit, quarum utraque contentum in-

36 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

tus mercurium colore eleganter prodidit. Nil adeo tam horum ductuum separationem iuvare expertus sum, quam si uterque mercurio repleatur. Quamvis enim in latere eiusdem linguae opposito, et in aliis quoque linguis, diverso modo, ductum detegere conatus fuerim, setamque sat alte intromiserim; hæc tamen potius inter Warthoni ductus membranas hæerere visa fuit, nec una cum vero, cui inerat, ductu, a socio sine ruptura separari potuit, secus, ac evenit, quando uterque mercurio repletus fuit. Proprio enim mercurii pondere, quisque eorum ab altero socioque divellitur. Ita vero, qui ex sublinguali glandula nascitur ductus, recto itinere, cum sibi ad usque Bb Tab. 1. Fig. 1. connexo, etsi ampliore quodammodo, Warthoni ductu, versus papillam, fertur, at iuxta eandem, lineæ circiter intervallo Warthonianum relinquit, et simili in papilla distantia, hiat. Sed ut ante docui, arctum admodum est orificium, nec sine opera detegitur. Et Warthoniano sublingualis noster

te-

tenerior est, dum amplitudinis dimidia fere parte ab eo differt. Maxime coarctatur, cum propius ad extremum accedit, ubi imprimis sua angustia a Warthoniano distat. Inferius ampliore alveo ab hoc digredi deprehenditur, ubi portio habetur glandulæ sublingualis ante dicta, quæ utrumque aliquantum seiungit, et sub altitudine B b Fig. 1. comprehenditur. Eadem Figura locus ubi prope papillam seta, B immissa fuit, et in ore hiat ductus novus et anterior sublingualis, propter glandulam reclinatam nimia inflexus, et a latere in glandula levata visus, indicari satis non potuit. Infra tamen iste alia occasione delineabitur, et omnibus rei veritatem inspicere volentibus, clarius demonstrare potero, quia inventum et a Warthoniano E. separatum, repletumque mercurio ductum, in Theatro nostro Anatomico servo integrum. Tam alte glandulam intravit mercurius, ut non exiguum eius copiam, pressione glandulæ, in ductum omni tempore transferre possim. Unde certus factus sum,

C 3

sum,

sum, quod is, qua suum e corpore sublingualis glandulæ ortum, tantum cum Warthoniano coalitum, atque nexum, formam denique et reliqua primum a me, quantum scio, detectus et separatus in glandula reclinata, demonstratusque publice fuerit. Nam de his ductus desiderat conditionibus, aut dubii sunt, aut prorsus silent, quotquot mihi legere contigit scriptores anatomicos, unde adeo dignam iudicaverim observationem hanc meam, quam cum aliis communicarem, ut ipsorum inde excitetur industria, utque in pluribus cadaveribus ab aliis quoque, iste Warthoniano distinctus, socius quam ductus, exquiratur felicius et inveniatur.

Inter inquirendum minus attentus facile errare potest.

Ut vero accurate fiant omnia, iterum iterumque moneo. Ubi enimseta minus caute intruditur manu, locoque prope papillam alieno, adigiturque tubulus, et immittitur flatus etsi tumere quodammodo glandular sublingualem appareat, non tamen protinus ad ductum verum, et corpus alte subeuntem, concludendum erit.

erit. Namque supra annotavi, glandulam, e lobis contextam, sua muniri cingique membranacea ac cellulosa capsula, in quam, ubicunque flatum immiseris per angustum hiatum, ibi agitationem totius glandulæ, et inter loborum interstitia ferri aërem, percipies, quod idem in maxillari quoque glandula experimur. Imo vero setæ iuxta frenum immissæ, nonnunquam antè versus mentum ducuntur, et quidem per poros, qui spectant ad glandulas exiguas, et distinctas, quas, buccalibus similes supra pronuntiavi, quosque poros *Nuckius* in Sialographia cum longioribus verisque ductibus confundit. Hæ etiam viæ, si paulo ampliatae, villata, fuerint, cum involucro isto flatum communicant, ut aërem ita immissum, etiam ultra glandulæ fines, et ad posticam superioremque linguæ regionem, si flatus continuatus fuerit, urgeri et erumpere, non una vice animadverterim. Neque adeo tales, cum sublingualibus istis verisque et eminentibus ductibus, unquam confundi velim.

40 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

Ufus primi ductus lateralis iam expositi.

Inventus ita demonstratusque anterior glandulæ sublingualis humanæ ductus excretorius, ad fundendam salivam non minus ac alii supra traditi disponitur, idoneusque censetur. Exporriguntur a medio mento ad usque linguæ radicem genioglossi et geniohyoidei musculi, pluresque hic linguæ subiiciuntur, qui exitum salivæ promovent, cum glandulam sublingualem, et quem descripsi ductum, sæpius concutiunt, propriumque suæ salivæ motum concitant atque augent. Quod ut feliciter eveniat, laxius hæret sub lingua glandula, nec dissimili ratione eadem infimo oris integumento tegitur.

Animus ad reliquos in utroque linguæ latere accurate invenientes applicatur.

Ductum hunc, cum præter alia observata, in duabus linguis in Theatro nostro anatomico auditoribus meis demonstrarem, in eodem semper loco ipsum non reperi, nec toti prospicere glandulæ iudicavi. Quam obrem in his pluribusque linguis omnem illum ambitum superficiemque, ubi glandula in ore prominēt suo integumento operta, et ad posterius usque linguæ ligamentum ex-

cur-

currit, quod versus uvulam ascendit et glosso-staphylinum complectitur musculus, accurate intueri et examinare suscepi, quo demum de omnibus ductibus, ante dicto similibus, quorum orificia hic aperiri possent, ita mihi, aliisque constaret, ut tandem aliquando a dubiis liberaretur hæc sublingualium glandularum excretio. Quod opus ut amplius perficerem, nulli aut tempori, aut circumspeditioni, aut labori peperci. Observationibus ergo quas olim hac de re iam institueram, ea potissimum adieci argumenta, quæ ex recentium quatuor linguarum humanarum, quas huic speculationi dicaveram, examine exquisito cognovi. Quanquam enim iam ante hæc tempora detexissem unum alterumque ostium, quod vel flatum, vel etiam tenuiorem fetam ad sublingualem deferret glandulam, nec tamen perpauca illa, obiterque tum notata, glandulæ, magnitudinem formamque perpendenti, fatiscerunt. Cunctas ergo observationes, iam in summam colligere, ac diversas quodammodo inter se conciliare

C 5

liare constitui. Quare iam plenius tradere proximum est, quæ assiduo labore, et indefesso linguarum examine expertus fuerim, quarum alias, maxillæ inferiori, et a nexu cum superiori liberæ, inhærentes; alias vero excisas, decenter perlustravi. Atque hic ea in mentem revocare oportet, quæ supra de glandulæ in viventibus situ nexuque differui. Hæc antè in ore, et sublingua ab utroque freni latere, a lingua fertur declivis, margoque exterior latiorque circa mentum maxillæque latus, sub gingivis adnascitur. Inde assurgit, et sub integumento oris flaccido, secundum linguæ longitudinem porrigitur. et interno suo latere cum lingua arcte committitur; quo ipso tractum illum glandula efformat, quem ore aperto prominere sub lingua, et in vivis conspici, supra observavi. Idem tractus glandulæ, ad laterale extimumve, quod ante descripsi, linguæ ligamentum protenditur, inde quodammodo flectitur, ubi tenuior facta, deorsum et ad finem suum vergit. In isto linguæ promontorio
tali-

talique eius tractu lineaque, quæ parum a recta recedit, reperiuntur inæqualitates, quas formant, vel parvi glandulæ lobi; qui sub tunica oris protuberant, vel quoque exigui fontes, dum elatis nonnihil papillis, aut saltem saliva turgidis orificiis, prominent, et in cavum oris hiant. Quorum orificiorum sicuti numere habentur plura, ita ad ligamentum usque linguæ, terminumque ante notatum, eleganti prorsus ordine disponuntur, omnemque attentionem merentur.

Ita vero positorum orificiorum constans est series lineaque linguæ proxima, ut minus se confundi patiantur cum aliis, quæ *Steno* depinxit atque quæ ductuum, versus gingivas e glandulis sublingualibus assurgentium, fines esse, asseruit. Quem cum alii, ut supra notavi, secuti fuerint, probe observandum est, quod et situs glandulæ obliquus, et eius in progressu extenuatio, spatium ante notatum, concedat, pluribus exiguis orbiculis atque glandulis, sub integumento oris iuxta maxillæ longitudi-

Vitari in hac doctrina debet glandularum confusio.

dinem, sparsis, atque prominentibus. Quarum nonnullæ, sicuti satis exiguos versus gingivas porrigunt ductus, ita eorum orificia quæ *Stenon* delineavit, quod in homine similia invenire licet, glandulis minoribus competunt a sublingualibus longe diversis. Ac recte *Bartholinus*, ut supra monui, *Stenonis* errorem detexit. Namque quæ bruta, peculiari huius glandulæ ductu insigni excretorio, gaudent, qui in ore prope Warthonianum sub communi papilla aperitur, in iis laterales mei prorsus deficient, adfunt vero *Stenoniani* ductus, qui buccalibus similes censentur. In homine autem atque in vitulis, aliisque animantibus, horum tubulorum plures examinaui, nec per ipsos intra sublingualium glandularum corpus, vel setam, vel flatum, vel mercurium iniicere potui, sed omnia sub oris integumento substituerunt. Et certe in modo dictis animantibus brutis sublingualis glandulæ situs, ductus laterales non admittit: Namque ea circa mentum prorsus acuminata definit, nec late,

ut

ut in homine, panditur; Tum etiam minus, ac in homine, in ore prominet, sed deorsum fertur, et maxillis musculisque submergitur. Quæ cum ita se habeant, permulta, quæ *Steno* et ex ipso alii de sublingualibus ductibus retulerunt, non levem emendationem mereri, patet. Sed ad novos, qui linguæ latera rigent ductus, et a me primum inventi fuerunt, describendos me accingo. Horum orificia non sub gingivis, sed loco satis remoto, et in ipso linguæ latere detexi.

Est vero inter linguas humanas quoddam, nec leve discrimen, et commode in duo genera eas dividi posse, expertus plurium exemplo sum; Aliæ enim circa mentum tenuiores minusque latas glandulas sublinguales subnexas habent; aliæ vero linguæ, multo latiores, ambituque maiori a corpore linguæ ad maxillam usque pandas referunt. Utrumque genus tandem in tenues lobos desinit, ut supra tradidi. Hinc simile inter ductus laterales, a me detectos, subnascitur discrimen. Namque

Duplex humanarum glandularum sublingualium, ex permultarum linguarum indagine statuitur genus,

que ubi glandulæ tenuiores et oblongæ magis sunt, tum tribus circiter lineis, primi lateralis mei orificium a Warthoniani ductus papilla et ipsi ductus ita feiuncti apparent. At ubi latiores maioresque in ore prominent glandulæ, tum vix unius lineæ spatio, ductuum meorum primi orificium, a papilla iam dicta abest. Sed in his glandulis ductus anterior excretorius cum Warthoniano, sicut supra indicavi, cohæret. Uti vero primi, ita et ceteri ductus, in utroque glandularum genere inter se variare solent. Namque in primo genere anteriores observavi minores præ reliquis, in altero vero maiores. Ex quo cum varient et glandulæ, et quoque excretorii ductus, in utroque genere exemplum proferre, apud me constitui, ut ductuum quodammodo pateat proportio.

Quæ in utroque genere communia sunt annotantur.

Ac primum ea referam, quæ non exiguam in investigando difficultatem pariunt, quæque ideo omnibus communia, ac in utroque genere familiaria esse, observavi. Ipsi ductus ubi iam detecti fuerunt, non prorsus
exi-

exiguus corporis nostri annumerari debent, sed pro suo, quo extant numero, parteque, ad quam spectant, satis ampli atque capaces conspiciuntur: Attamen quotquot eorum detegere licet, hi omnes circa ostia extrema valde coarctantur, ut puncta quædam exigua, poris similia, sæpe exhibeant. Qua angustia sua, maiores salivæ canales excretorios, parotidis et maxillaris glandulæ imitantur, et quoque adstricta osculorum angustia detegendorum difficultatem auget, quæ tum maior certe evadit, quando omnes, in utroque linguæ latere, invenire, fetisque immixtis distinguere conamur. Sed tractu, quem supra observavi, bene notato, laborem vincit acies visus, tubulorumque aptorum usus, per quos flando aër inspiratur. Neque tamen tantum requiri laborem comperi, quando in recentibus linguis orificia quæfivi, quam, ubi pluribus post mortem diebus ea investigavi. In istis enim, cum satis diductæ a se mutuo essent maxillæ, et linguæ integræ in inferioribus adhuc hærerent,
in

in iis ductus perveſtigare licuit; quamquam hic quoque labor, propter flaccidum nimis ſublinguale integumentum tædio penitus non caret. Ubi vero exemta e maxilla lingua, hos ductus exquirere animus fuit, tum ductus præ pondere partium cum glandula connexarum, ita trahuntur, tendunturque, ut ſubſideant ipſorum orificia, viſuique ſe propemodum ſubducant, et laborem tædio plenum ac diuturnum ſæpe reddant. Adhæc teneros adeo ductus, exiguaque ipſorum orificia, non aliter inveſtigare decet, quam ubi madet adhuc ſublinguale integumentum. Industria vero adhibita, et aëre inflato, tandem tam exigua aperiuntur oſtia, quæ, ſi ex ſetis, quas immittere ſoleo, eadem quodammodo æſtimare conveniat, aut cum papillæ Warthonianæ oſtio ſaltem comparare, triplo circiter minora eſſe meorum orificia iudicare cogar: quamvis ut infra dicitur quædam quoque in hac amplitudine aliquando occurrat varietas. Quamobrem mirandum minime eſt, quod hi ductus ob tantam, quam in-

ter

ter inveniendum difficultatem præ-
sent, oculos anatomicorum hætenus
effugerint. Sed quotquot reperi,
omnes, statim ab orificiis ampliores
fiunt, ipsumque glandulæ sublingua-
is corpus, et in utroque latere in-
trant, altasque in eo radices agunt,
et in eodem sub linguis tractu emer-
gunt, orique inferuntur.

Quibus expositis, in primo, quod
stabilivi linguarum genere, tenuiori-
busque glandulis, iam ductuum dis-
crimina subnectam, et quæ fetis por-
cinis immixtis, aut aëre iniecto, aut
aliter indagari a me potuerunt, ex-
hibebo. Sigillatim vero primus, se-
cunda notatus, Tab. I. Fig. 2. B. qui
in hoc genere trium circiter linearum
intervalla a papilla Warthoni remotus
esse solet, eandem fere amplitudinem
et quoque longitudinem refert, at-
que ea est, quam obtinet secundus
C. In utrosque vero profunditate
quinque circiter linearum, fetas in-
tra glandulam adegi. Ipsum glandu-
læ corpus F. tum vix ultra septem
lineas latum antè inveni. Duct-
us secundus a primo tribus distabat

*Quæ in pri-
mo genere
glandulis-
que minori-
bus ac te-
nuioribus
propria ha-
bentur.*

lineis, et utrique quæ feta immiffa fuit, non quidem in linguis, quæ maxillæ adhuc inhæferunt, fed in linguis iam exemptis, resectisque, fere parallelæ apparuerunt. In utrumque, ita inventum paulo facilius, ob ampliora orificia, fetas agere potui quam in duos reliquos, qui in eodem, sub lingua, tractu fequuntur. Tertii namque D. et quarti E. orificia, equidem ante dictis angustiora quodammodo inventa fuerunt, fed mox iftis ampliores apparuere ductus ut cum flatu expansi, aliterque repleti, et altius intra glandulam perveftigati effent, tumore multum superiores fuerint iftis, quos primo nominavi loco. Horum Tertio in lingua quæ hic icone expreffa habetur, fetam ad fex usque lineas indidi, quantum vero longiffimum deprehendi qui decem lineis fetæ ingreffum in glandulæ corpus patefecit. Hi duo ultimi ficuti ftatim post introitum ampliores fiunt, ita uterque pro fua longitudine, figillatim vero quartus, a lobum glandulæ usque fertur. In quo vero fe exhibent, ut Tertius $9\frac{1}{2}$ lineis

neis, quartus vero digito cum linea, a papilla Warthoniana suis orificiis absint, neque sibi ut ante descripti paralleli sint. Magis vero in vivis a tali itinere deviant, glandulæve fitui naturali, quodammodo arcuatæ, conformes se præstant.

Nunc ad alterum linguæ glandularum genus me convertō, ubi latiores maioresque glandulæ, anteriori linguæ parti linguæ subnexæ, et maxillæ muscutorumque genioglossorum parti adnatæ, habentur. Etsi in hoc genere, numero pares detexerim ductus et a linguæ latere porrectos truncos, quorum in simili sub linguæ tractu sita sint conspicuaque orificia, mirum tamen est inter singulos discrimen, et a primo genere fluctuum omnium diversitas. in hoc namque, quod iam declarabo, glandularum genere, lateralium, primi Tab. II. feta B notati orificium, non est ante, tribus quatuorve lineis, sed una circiter, quandoque etiam minori intervallo, a papillæ Warthonianæ ambitu, remotum fuit. Id ipsum orificium inter reliqua satis patulum

De altero glandularum genere observatio- nes.

reperi, nec fetam ægre admisit. Sed qui inde versus glandulam porrigitur ductus, is longe amplior ac primus in ante dicto genere, protinus ab orificio evadit, cui ad decem fere linearum longitudinem intra glandulæ corpus feta immissa fuit, prorsusque convenit cum eo, quem supra descripsi, mercurioque replevi. Ubi vero lingua adhuc intra maxillam hæret, oblique deorsum, ad morem connexi Warthoni ductus, fertur. Quem ubi relinquit, potius versus glandulam reliquam inde deflectitur, et in ramos dividitur. Sed hunc proxime sequitur alius C. qui non minus insignis censetur, imo amplitudine et longitudine ante dicto æqualem reperi. Undecim lineis cum semisse a papilla Warthoniana remotus fuit. Hi duo anteriores opera leviori quam ceteri deteguntur, quia et ampliores sunt, et plus continere valent. Tertius D intervallo digiti cum quatuor lineis ab ista papilla aberat, et ad decem linearum profunditatem, fetam per ipsum, in glandulam intulit. Quarti E orificium digitum et $8\frac{1}{2}$ lineis

neis a papilla distabat, et ultra 7. lineas immittere setam haud potui. Sed tum in tenuem lobum F. minoremque, ut in priore genere, iam desinit glandula. Hic quandoque unum aut duo orificia e. e. post quartum modo notatum detexi, quæ setas oblique antrorsum ad ipsum ductum quartum, ceu huius rami admiserunt. Quos autem cum non semper reperire mihi licuerit, utpote exiguæ notæ ramos, ad præcipuorum et constanter observatorum numerum quaternarium non refero. Ex quibus iam in utroque genere prolatis, patet insigne glandularum ductuumque competentium discrimen. Hoc quidem, ultimumque genus, plus salivæ largiri videtur istud quodammodo minus, quod iudicare præcipue convenit, ex glandularum anteriori latitudine. Namque transversam glandulæ nostræ ultimæ latitudinem sub fine primi ductus, aut potius setæ immissæ, digito cum tribus lineis inveniri æqualem; at sub finem secundi, $11\frac{1}{2}$. lineas, terti vero $10\frac{1}{2}$, quarti tandem 8. lineas latitudo referebat.

Tum vero glandula in latitudinem linguarum quatuor, minoremque ac in suum lobum versa, cum maxillari processu aut lobo committitur, itaque cum Warthoni ductu, quem uterque medium tenet, ad corpus usque maxillaris glandulæ porrigitur et definit. In hoc tandem linguarum genere ubi primus ductuum adeo vicinus est papillæ Warthonianæ, ne ullum ductuum itineris paralleli pateat vestigium.

Octo novorum ductuum usus.

Quantum igitur permultarum linguarum examine probe instituto, observare potui, quatuor in omnis linguae humanæ latere utroque habentur orificia, quibus totidem ductus salivales tanquam radicum ramorumque in glandula sublinguali collectorum trunci conveniunt. Hos sæpe dimidia, aliquando tertia aut quarta amplitudinis parte, quæ Warthoni ductui in vicinia excurrenti competebat conspicuos reperi, neque ipsi dissimili intra glandulam proveniunt origine, atque supra de Parotidum et Maxillarium ductibus prædicavi, si cuti mercurio injecto aliisque experiri.

rimentis comperi et ex glandulæ præ-
sentis cum istis comparatione facta
collegi. Sunt vero hi ductus, veri
canales excretorii, et ampli et paten-
tes adeo post angusta eorum orificia
fiunt, ut tot tantique qui a linguæ
utroque latere procedunt, pro ex-
cretionem, ex tota glandula perficien-
da, sufficiant. Quem in finem e-
gregie apteque disponuntur, et sin-
gulis glandulæ portionibus dicantur,
commodeque inferviunt, et admira-
ri decet, et orificiorum et ductuum
in utroque linguæ latere similitudinem.
Quæ sicuti in una linguarum humana-
rum eleganter inter se conveniunt, i-
ta in pluribus, suo duplici ordine
modoque, quo ostia locari, ductus-
que ampli longique esse et excurrere
solent, æque glandularum amplitu-
dinis, in utroque genere iam propo-
sito, proportionem servant, ac sa-
pientiæ providentiæque divinæ sunt
testes. Namque ipsi præcipui cen-
sentur fontes, qui gingivarum latera
interna, ipsisque insitos dentes, sa-
liva perfundunt, et linguæ notabilem
tractum, orisque basin utrinque ri-
gant

gant, perpetuoque madore perfundunt. Multum proinde hi conferunt et ad alimenta, in ore facilius dissolvenda, et ad loquelam continuandam, pluresque instituendos linguæ et connexorum in ore motus. Quis motus sicuti valde necessarii proficuique censentur, ita quoque siccitas organis in ore obesse, merito putatur. Quamobrem detecti iam laterales in homine ductus, perniciosam oris fauciumque ariditatem eo melius avertunt, quo aptius liberiusque utraque glandula linguæ subiacet, ut ex utraque, tanquam mammis prominentibus, tubulisque ceu papillis inde exortis, pro varia incumbentis linguæ agitatione motuque, perinde ac muscutorum vicinorum contractione, proprius secretæ intra glandulas salivæ motus, mirifice iuvetur, ipsa vero saliva prout expedit, e ductibus largiter expellatur et profiliat. Suadent hæc et aptissimus laudatarum glandularum ductuumque situs nexusque, et, quod supra iam monitum, tot canalium cum amplitudo, tum longitudo. Quibus recte expensis

nemo

nemo errorem facile committet, si ex tanta glandula itaque constitutis canalibus, cognitis recte æstimatisque, vix inde minorem accedere salivæ copiam, et ad linguæ latera manare existimet, atque ea est, quæ ex papilla Warthoniani ductus prorumpere solet.

Cuncta quæ de novis his laterali-
bus ductibus glandulæ sublingualis pro-
posui, nupera Anatomia publica Au-
ditoribus meis abunde exposui, et
plures utriusque generis supra stabili-
ti linguas, quas ideo in Theatro a-
natomico servaveram conspiciendas
præbui, et sicuti omnia, it et nu-
merum IIX principalium meorum du-
ctuum, recentis linguæ demonstrati-
one, iterum confirmavi, et in latis
amplisque glandulis, cadaveris cuius-
dam masculini sexus, in utroque lin-
guæ latere quatuor principales supra
relatos exhibui. Erat homo exiguæ
staturæ exiguoque collo præditus, et
talibus faucium apparuit conditio, ut
ante sectionem quodammodo sperare
possem, latam me inventurum glan-
dulam sublingualem, valdeque Wart-

*Eorum du-
blica de-
monstratio
in pluribus
linguis.*

honianæ papillæ vicinum, anteriorem a me inventum ductum. Quæ res uti voto respondit, ita ad vivum totam Tab. II. delineari curavi linguam, quæ libera, et suspensa cum ductibus detectis notatisque conspicitur.

Reiiciuntur aliæ opiniones.

Quibus factis observationibus, falsum esse pronuntio, unum universæ sublinguali glandulæ humanæ, ut in brutis repertus est, competere ductum excretorium. Errorem inde natum coniicio, quod vel minus dextre inquisiverint artis anatomicæ professores, vel anatome brutorum comparata contenti, ab opere manum abstinuerint. Nunquam observavi, ductum, qui glandulæ laudatæ competat, suo orificio aut in Warthoni papillæ interno; aut externo, ambitu, sub lingua humana hiare, aut proxime, ut supra de vitulo retuli, in ore aperiri. Sed quæ supra in utroque glandularum nostrarum genere proposui, cum aperta sint, ex iis plurimum excretoriorum ductuum ratio æstimari debet. Quanquam enim ætatis ratio pluresque causæ quan-

ti-

titatis modum mutare valent, vix tamen universa uniuscuiusque linguae connexarumque partium conditio, et ductuum dispositio, notabilem quandam in proportionem mutationem admittent. Atque sic quem supra detexi mercurioque replevi Warthoniano focium, glandulae sublingualis ductum, pro lateralium novorum primo, iure meritoque habeo. Et si enim ille longior quodammodo in icone appareat, ac is quem iam primo consignavi loco, id tamen et a pondere mercurii contenti oritur, et inde maior factus reputatus a me fuit, quod foemina illa cum viveret mercurio usa, lueque venerea mortua esset. De reliquo vero cum hoc asserto, et quas supra tradidi observationes, et plures quas in altero linguarum genere feci, figillatim quas Tab. II. exhibui prorsus conveniunt. Namque orificium huius egregiae capacitatis ductus, a papilla Warthoniana lineae intervallo distat, et ipse cum Warthoniano fociatur ac a superiori parte cohæret, mox vero pro glandulae situ naturali oblique descendit, do-

donec, Warthoni ductus, in sublingualis glandulæ corpore inde recedit, et altius fertur.

Inter investigandum hocce ductus, errores vitandos esse, monetur.

Ut vero omnis vitetur error id iam monere fas duco, ne in primo ductu laterali, æque ac reliquis inveniendis explorandisque quis adhibeat rigidas crassasque fetas porcinas, quas Warthoni papillæ ostium admittere valet; sed postquam orificia flatu reperta fuere, triplo circiter tenuioribus uti licet, ne forte pertusa interiori oris tunica, ad sublingualis glandulæ involucrum violenta manu aditum paremus; ut flatu porro adducto, qui ita integram sæpe glandulam agit, decipiamur, falsoque opinemur, nos in vero versari ductu. Qui error aliis sæpe numero imposuit. Sed is detegitur, cum pluribus locis tales ingressus parare, similemque effectum præstare, et flatu continuato, per eiusdem tunicæ tractus in vicinas quoque partes et ad ipsam linguae summitatem radicemque aërem transferre valemus.

Alii minoris notæ tubuli gland-

Fontes supra exposui, qui e Parotidibus Maxillaribusque glandulis

oriuntur, et salivam reddunt, quorum alii buccas proximasque humigant gingivas, alii linguæ apicem prope frenum humore conspergunt. Uterque vero humor, suctione ad quemcunque locum linguæ, præsertim agitatae pervenit. Superfuere igitur, quos inveni exposuique laterales salivæ fontes, qui utrumque linguæ latus, humore pariter perfundant. Horum octo iam descriptos, in duplici glandularum sublingualium humanarum genere, huic inservire fini, et præcipuos esse commodosque, tum declaravi, cum eorum a me detectorum rationes protuli. Iam ubi de fontibus, qui linguam irrigant, mihi porro sermo faciendus est, alii minoris notæ rivuli, ac potius pori, qui e glandulis, buccalibus, aliisque similibus, et imprimis iis, quæ prope gingivas consistæ sunt, et in ore dispersæ, proferendi mihi essent, quod hi, cum laticem in ore reddunt, linguam quoque ita afficiant. Sed his commode supersedeo, quod a *Stenone* aliisque satis expositi iam fuerint, et iidem e supra dictis pariter con-

dularum in ore dispersarum commemorantur.

62 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

constent, et quod earum cognitionem
atque usum ea, quæ adhuc sequun-
tur, ob quandam similitudinem, con-
firmant.

*Alii pori
exiguique
ductus qui
in linguæ
superficie
biant.*

Namque restat ut loquar de fon-
tibus, quos lingua ex proprio suo
corpore promit, sibi ipsi suppeditare
videtur. Atque horum tubulorum
aut pororum, qui in apice linguæ
totaque anteriori eius parte dissemi-
nantur, longe minor est numerus
præstantiaque, quam ut cum aliis
qui posticam linguæ superficiem ma-
gis componunt comparari mereantur.
Ista enim linguæ parte pauciores et
dispersi, halitum solum fundunt; hæc
vero, et plures exant, et in fasci-
culos congregantur; qui ita collecti
ad extimam linguæ superficiem assur-
gunt, et sub papillarum forma mul-
toties protuberant, ubi superius lin-
guæ integumentum, quodammodo
elatum, hos pororum fasciculos cin-
git atque munit. Qui ita prominent
æque ac alii, et minoribus aggeribus
versus extremam linguam conspicui
iure quodam habentur pro collecti-
tubulis excretoriis plurium, etsi mol-

liorum glandularum exiguarumque. Namque in hac regione madida perpetuo redditur lingua, et, si digitis prematur, humorem salivalem maiori copia fundit, quam versus apicem linguæ. Namque hic cum musculares fibræ desinunt, et nervorum colliguntur papillæ atque prominent, minus conceditur spatium glanduloso contextui forte permiscendo; sed humoris inopiæ potius succurrit, uberimus salivæ e Warthonianis ductibus, meisque lateralibus sub freno, affluxus, quo linguæ apex pro perficiendo gustu, haud levi cum commodo, irroratur. Namque utilissimum pro hoc sensu, naturæ institutum est, ut quæ fibris cuspidatis, tanquam pilis reclinatis, et ex tunica linguæ externa ortis, velantur muniunturque nervorum papillæ, ita in apice linguæ humore illinantur, ac ut reliquæ, quæ in ulteriori eius tractu extant, madore, qui e glanduloso his interiecto contextu provenit, molliantur, ut pro sentiendis particulis sapidis præsto sit ipsarum vehiculum, et sensui idoneæ ferventur nervorum papillæ;

64 *De Novis Ductibus Sublingualibus*

læ; Quæ, sicut circa linguæ apicem e collectis nervorum ramis exiguis molliores, et sub forma plerumque capitum fungorum, per linguæ tunicæ externæ retisque subiecti, poros prominent ac sensiles habentur, ita his in ulteriori linguæ tractu deficientibus, conferuntur plures aliæ papillæ quæ laxæ potius et spongiosæ sunt vaporemque fundunt. Quamobrem interioris linguæ tunicæ posteriorisque compages minus nervosa, sed spongiosa potius ita apparet, ut glandulosi folliculi poris pertusi, mollem attactu flexilemque ac prorsus succulentum linguæ ambitum reddant.

*Quanti
æstimanda
sit hæc ma-
doris ex-
cretio.*

Quamvis vero hæc linguæ tunica præcipue qua posteriorem sui partem glandulosa vocari possit, et vaporem emittat, qui linguæ conducit: attamen huius copia, cum illa, quæ eodem tempore, aut e ductibus meis lateralibus, aut e Warthonianis excernitur, comparari haud debet. Id sensu in vivis comprobatus, si lingua levatur linteoque sublinguale latus abstergitur et siccatur, tum stillare quæ pro-

prominent orificia, et restitui humorem comperimus; quæ humoris restitutio frustra expectatur, ubi lingua protenditur, eiusque superficies altiori loco ficcatur. Id vero animadversione dignum censeo, quod, quæ ita mollis ac spongiosa est, et excretioni vaporis salivalis dicatur, interior linguæ mediæ postremæque tunica, non solum externum huius ambitum quodammodo irriget, sed simul humiget, quæ tegit et proxime sub ea latent tam vasa et membranas, quam musculos. Namque hæ partes, tanquam motuum linguæ adminicula, in tanta motuum varietate numeroque ita illinuntur, quo cuncta in debita ad flectendum aptitudine conserventur.

Humori inde, potius descendenti superfluoque exitus sic equidem conceditur, per poros ductusque, quos in lingua papillisque colligi dixi, sed et provida natura sæpe uno, quandoque duplici hiato orificioque, linguæ hunc in finem prospexit. Reperitur tale orificium iam maiori iam minori ab epiglottide intervallo, et

E

quan-

Sinus in lingua postrema, simplici quandoque duplici orificio apertus, et tunica radice linguæ fauciumque celulosa exponitur.

quandoque loco, ubi foramen est quod coecum appellant, invenitur, idemque in lingua Tab. III, Fig. I. duplex exhibeo, quorum alterum in media linguæ linea, indicatum seta G, alterum in papilla quæ seta F. notatur, apertum inveni. Idem vero sicubi simplex aut duplex reperitur, eructare in vivis putatur superfluum illum humorem, qui ex spongioso glandulosoque linguæ ambitu, ad partes subiectas irrorandas defluit. Namque hic reticendum minime est, quod statim sub glandulosa linguæ superficie, tela aut membrana cellulosa posticam partem linguæ non exiguan radicemque obvelet, et sic producatur ad reliquas fauces. Namque hæc multiplici tractu fertur, et superinducitur superius epiglottidi, et ad glandulosam compaginem, quæ tonsillas a latere complectitur, uvulamque in medio sustinet, protenditur, porrigiturque sub ligamenti ossis hyoidis et laryngis, ipsique competit glandulæ thyroideæ, qua laryngi et asperæ arteriæ annectitur; deorsum vero et inter musculos eadem quasi

pro-

propagines demittit, quibus et cum illo involucro cohæret, quod sublingualem glandulam et maxillaris partem investit, ut supra annotavi. Quæla molli flexilique tot partibus ineriecta, ac, ut ante retuli, irrorata, tanquam artificio consilioque opmo, linguæ, connexorumque moris, egregie iuvantur. Namque æc tunica cellulosa maxime in radice linguæ excipit, quam ante dixi humiditatem, et cum sinubus orificiisque, quæ modo in linguæ radice incavi, ita conspirat, ut cum flatum per hæc immitterem, protinus extenderetur integer fere faucium forx. Proinde aëre intumuit linguæ radicis seu extenuatæ portio, Tab.

Fig. I. D. D. D. et quoque ad glottidem tonsillasque flatus trans, ipsaque thyroidea, ob nexum quem ante exposui, agitata fuit. Hinc continuato impetu, et ad sublingualem et ad maxillarem glandulam verflatum intellexi. Ceram cum o-

in huius modi finum iniicerem, ulæ sub lingua repletæ, variique inæquales tractus exhibiti, et ad

ante dictas partes nullo ordine, formaque, qua cum veris ductibus excretoriis eorumque ramis convenirent, versus utrumque latus porrecti fuere. Hos ergo sinus pro ductibus excretoriis glandulae alicuius et peculiaris quae fauces hoc loco ambiat, habere non potui. Namque sive aërem sive mercurium sive ceram iniicerem nunquam ramos pro trunci magnitudine comparatos et in utroque latere dispersos distinctosque, ut in aliis glandularum ductibus, ipsisque parotidibus et maxillaribus, evenit, observare potui. Et subita, quae post aërem tubulo iniectum secuta, fuit mollis in linguae radice expansio, longe diversam a glandulosa substantia hanc esse, comprobavit, aëreque statim distentam, magis cum vesicarum vel cellularum congerie comparare licet, quam ipsam habere praesens substantia densiore et glandulosa, quae tardius minusque intumescere solet, ubi per ductum excretorium aër infertur, Sed aliter quoque, quae a tegmine linguali postico et cellulosa tradidi, confirmavi. Namque

hæc amplius explorarem, in pluribus linguis, ubi hiatus ante dicti, in linguæ superficie defuerunt, cultro incidi, tubulumque applicui, et postea aërem immisi, tum omnem illam telam similem in modum intumescere et partes ante notatas inflari, ac si per sinus id instituissem, observavi, auditoribusque meis demonstravi. Incidi vero linguæ radicem locis incertis, iam in medio, iam a latere, iam quoque circa finem, idemque semper obtinuit.

Huic telæ cellulosæ superinducitur quæ antè papillis nerveis referta, hic vero et in radice magis glandulosa est linguæ tunica, quæ pariter superius versùs tonsillas uvulamque, ac versùs epiglottidem et alia loca porrigitur, et quoque cohæret cum illo, quod a capite in imis faucibus pendet, glanduloso velo. Transversum hoc velum obtinet situm, pendulamque in medio uvulam gerit, cuiusque musculos complectitur. Idem æque ac epiglottis in sua superficie foramina permulta, nullo ordine numeroque certo exhibet, quæ

*Orificia
excretioni
dicata ini-
mis fauci-
bus.*

dicari excretioni laticis, cum ista simili, quam exposui, ubi de papillis in lingua mentionem feci, iudicatur. Neque vero alio modo excernunt glandulæ arytenoideæ, quas circa epiglottidis radicem sub ligamentis foraminulis excretoriis pariter pertuffis *Cl. Morgagnus* detexit; tonsillæ quæ paulo altius locantur, suum humorem ita fundunt. Namque in harum quoque lacunis nil nisi pororum excretoriorum conspiciuntur congeries.

*Occasione
huius tuni-
cæ, peculia-
ris de ductu
uno altero-
que in la-
rynge re-
perto, pro-
fertur ob-
servatio.*

Tam late igitur sicut exposui, panditur, et tunica linguæ posterior glandulosa, et quæ subiicitur cellulosa. Hæc dum laryngem asperæque arteriæ partem cum glandula thyroide suo interventu unit, aërem, ubi per illos sinus atque hiatus in linguarum summitate sæpe conspicuos, iniectum fuit, eo perducit. Ita vero falli aliquis facile potest, si inde statim iudicaverit ductum quendam excretorium huc e thyroidea ferri; Sicut alii expansione flatu facta inducti plures ab eiusmodi sinu, tanquam centro porrigi ductus excretorios tan-
tosque

tōsque existimarunt, qui glandulis sublingualibus, et fere omni linguæ fauciumque loco conveniant. Hic minus attentorum error commode comparari potest cum eo, ubi inter exquirendum foramina, quæ conspicua sunt in larynge et aspera arteria, thyroidea glandula contactis, seta paulo rigidiores aliquis utitur: tum enim pertundendo laryngem ad usque tunicæ cellulosæ productionem, postea vero adigendo flatum facile is decipitur, si ob glandulam flatu quodammodo agitatam, ita detexisse se ductum huius excretorium diu desideratum, sibi persuadet. De quo cum nuper admodum sollicitus essem, non quidem setæ, sed flatus impetu in portione laryngis ac asperæ arteriæ, cum thyroidea glandula adhuc connexæ, detexi ductus, quos Tab. III. Fig. 2. delineavi. Ostia erant C et D et serpentino ductu flatus promovebatur per ductum unum æque ac alterum et complures rami, sicut icone expressi fuerunt, conspiciebantur, qui aërem profundius ducebant. Sed teneritate vasorum lym-

E 4

pha-

phaticorum conspicui hi erant, et omnino ad thyroideam glandulam ferebantur, sicuti, cum glandulam inciderem, observavi. Sed clara luce, ac in macerata quodāmodo glandula, hæc ita observare potui. Quos ductus etsi solos, præcipiti nimis consilio, pro excretoriis vasis huius glandulæ non venditem, tamen hac observatione mihi aliisque auctor sum, ut tales pluresque pervestigentur, qui excretioni in hac glandula celebratæ, ad hoc usque tempus dubiæ visæ, præesse putentur.

*Doctrinæ
propositæ et
factarum
observationum
finis
atque usus.*

Iam quidem tradidi quæ sedulo factæ observationes mihi suppeditaverunt. Quod institutum suscepi, ut excretionem glandulæ sublingualis, dubiam adhuc vexatamque, luculentius exponerem, quod ita perfeci, ut quæ apud alios Anatomicos deficiunt, commode suppleri, quæ vero superflua produnt, tuto negligi possint. Ad horum numerum pertinent, quæ de ingenti ductu salivali communi et novo eiusque ramis maxillares et sublinguales glandulas, et fere

fere reliqua linguæ fauciumque loca inde porrectis, nuperrime quidam Anatomicus protulit. In quem ductum lingua quam Tab. II. icone exhibui, non ea inquisivi fide, ac si ab indole ductuum excretoriorum, qui e glandulis conglomeratis provenire solent, non alienum ac superfluum reputarem, quod rami sicut ab isto icone expressi fuerunt, sublingualium et maxillarium superficies more insolito perreptant, et cursum salivæ, quæ continuo eructari debet, minus idoneum inferunt; quod ut aliis demonstrarem, quæsi vi venam lingualem H, quæ ramum h ad linguæ radicem ablegat, et maxillari in O resectæ jugularique venæ interponitur. Hæc namque, etsi ob valvulas, quæ obstant, minus commode per orificium inferius H inflari potest; tamen cum per id, quod apud O constituitur, aut locum vicinum incisumque aër iniicitur, tum hæc vena lingualis ramique eo modo eoque ordine intumescunt, ut truncum atque ramos, quos ille icone delineavit, in glandulis reclinatis cum trun-

co ramisque folius venæ H conveni-
re, iudicare debeam. Sed quæ in
ore derivant, et cuncta, quæ his
paginis comprehendere volui, artis
medicæ peritos moneant, ut sublin-
gualium glandularum usum melius
quam hætenus factum fuit, explo-
rent et simul æstiment. Tum verò
maxime, quam supra proposui, do-
ctrina, Medicis, præcipue vero Chi-
rurgis utilis erit proficuaque, cum
morbi occurrunt, qui sublinguales
glandulas, et partes quæ adiacent ip-
sis et in ore continentur, infestant.
Namque, quæ dixi orificia in com-
modo linguæ situ, modoque quem
supra notavi discernere et invenire
artis peritus facile poterit, rivorum-
que salivalium, quos supra erui, tra-
ctus ita diiudicare, ut quantum in
ipso est sibi caveat, ne instrumentis
lædat aut penitus destruat et ipsorum
ingressus et qui subiiciuntur ductus.
Hæc qui attenderit, is quæ modo
dixi loca viasque, in scirrhis, ul-
ceribus, pluribusque morbis, quibus
hæ glandulæ partesque connexæ fre-
quenter laborare solent, pro viribus
nec

nec levi cum ægrotantium emolumento pariter defendere ac tueri al-
laborabit.



76 FIGURARUM EXPOSITIO.

TAB. I. Fig. 1.

Linguam a latere visam cum sublinguali glandula reclinata repræsentat.

A. Seta porcina, ductui Whartoniano inserta.

a. Integumentum oris sublinguale retractum.

B. Seta novo inbærens ductui sublinguali anteriori et Mercurio distento.

b. B. Portio huius ductus, qua is liber a nexu cum Warthoniano primum apparuit.

C. Glandula sublingualis reclinata.

D. Glandula Maxillaris.

E. Ductus Warthonianus.

Fig. 2. Portionem sistit linguæ. glandula primi generis seu tenuiore instructæ, cum octo novis in utroque latere ductibus excretoriis. qui setis indicantur.

A. A. Ductus Warthoniani.

B: B. Ductus novi anteriores glandulæ sublingualis excretorii.

C. C. Secundi. D. D. Tertii. E. E. Quarti.

F. F. Corpus glandulæ, sui parte sub integumento oris conditum, quod in vivis versus maxillam protenditur.

G. G. Locus ubi in utroque latere idem corpus in lobum desinit.

H. Musculi genioglossi.

I. Integumentum oris sublinguale.

Tab. II.

Linguam, cum octo novis lateralibus ductibus, in alterius generis glandulis sublingualibus majoribus latioribusque, setis notatis, exhibet.

A. A. Setæ in ductus Warthonianos immissæ.

B. B. Primi et anteriores novorum lateralium ductuum sublingualis glandulæ excretoriorum.

C. C. Secundi. D. D. Tertii. E. E. Quarti.

e. e. e. e. Obliqui exigui, postremorum ramî, rarius

rius observati.

- F. F. Glandula sublingualis lobum versus extenuata.
 g. g. Lobus maxillaris glandulæ.
 G. G. Corpus maxillaris glandulæ.
 H. Vena lingualis trunco maxillaris venæ et iugularis externæ interposita, ramum ablegans.
 b. versus radicem linguæ, et porro prospiciens maxillari glandulæ, et ramos tribuens sublinguali glandulæ.
 I. Nervus a pari quinto deductus.
 K. Arteria lingualis cera repleta.
 L. Musculus Mylohyoideus super laryngem et connexas partes reflexus.
 M. Musculus geniopharyngeus reflexus.
 N. Ceratoglossus. O: Genioglossus.
 P. Nervus paris noni.

TAB. III. Fig. 1.

Sinum alias simplicem, hic duplicem circa linguam postremam apertum refert.

- A. Caro glandulosa, hic una cum uvula pone epiglottidem coacta et reflexa.
 B. Tunica buius anterior, in qua conspicua sunt foramina excretoria.
 C. Epiglottis. D. D. Radix linguæ inflata, æreque tumidis elatisque papillis conspicua.
 E. Ligamentum linguæ laterale quod glossostaphylinum complectitur musculus.
 F. Sinus sive hiatus foramine patens sub papilla, et seta notatus, qui spectat ad tunicam cellulosa sub glandulosa linguæ superficie locatam, quæ sicut in D. D. aëre distendi solet, si per tubulum immittatur.
 G. Alius sinus, qui in media fere linea frequenter hiare observatur.
 H. Foramen Cæcum.

Fig. 2. A. Glandula thyroidea.

B. Annuli cartilaginei asperæ arteriæ aperta.

C.

C. et D. *Ductuum tenerrimorum oscula, in quæ,
ubi flatus iniectus fuit, rami icone expressi,
apparuerunt.*

E. *Portio cartilaginis thyroideæ adhuc connexa.*



Fig. 1.





Fig. 2.






Fig. 1.





Fig. 2.



*De Sublingualibus Salivæ
Ductibus, Anonymi epis-
tola ad Actorum Erudito-
rum, quæ Lipsiæ publi-
cantur, Auctores.*

*Hæc Epistola Actis Lip-
sienſibus Mensis Julii A.
MDCCXXV. Pag. 325
est inserta.*

TAbula III, quam vos adjunx-
is Actis Eruditorum mens: Julii
ni superioris MDCCXXIV ostensa
mihi est ante aliquot hebdomadas
Juvenibus quibusdam nostratibus,
anatomiae studiosis, ut ex ipsâ no-
tis, ut ipsi dicebant glandularum sub-
lingualium rivos cognoscerem. Quos
cum in eâ tabulâ inspexissem, res-
pondi, eos mihi videri, quos cele-
berrimus Patavin. Anatomicus pri-
arius Jo: Bapt: Morgagnus iam
idem in ultimâ animadversione ad-
versariorum anatom. VI descripserit,
ubi nimirum docuit, multoties com-
mune utrinque vascula et hæc ab ex-
te-

terioribus sublingualium glandularum lateribus exeuntia, et non magno glandulis intervallo, peculiari quodquo osculo hiantia, tum se conspexisset, tum amicis præsertim Venetis ostendisse, et sæpius tenuiores fetas in ea oscula immisisse, addidi nullo alio magistro quam his ipsis, quæ memoriter retuleram, Morgagni verbis, rivis vos in illâ tabula pictos, a me iam pridem in linguâ humanâ quæsitos et satis superque esse conspectos. Verum juvenes iidem, ut, quod mihi dixerant, tuerentur, actorum nominati M. Julii pag. 292 et 293 confestim monstrarunt, ex quibus cognovi, a tabulæ istius Autore totam illam Morgagni animadversionem in aliam omnino partem trahi. Ego autem, quamvis mihi viderer posse, imo debere ita omnia Cl. Morgagni verba, explicare, ut primæ illi, atque obviæ interpretationi, quæ ego ipsa semper acceperam, non repugnarent. Tamen ut intutiles verborum controversias effugerem, tum filii, præsertim cum viderem, aliam multo faciliorem, eandemque certius finiri

nam esse viam, hanc veritatem indagandi, quam miror alios non esse secutos.

Scilicet ad Amicos quos in Italia habeo, literas dedi, ut non jam ex ipso Morgagno sed ex altero Anatomico Patavino, præsertim vero etiam ex aliquo eorum Venetorum, quibus a Morgagno olim, ut supra dictum est, sui ductus sublinguales demonstrati sunt, quærerent, non modo quomodo ipsi Morgagni verba interpretarentur, verum etiam, idque præcipue, quænam revera solitus sit Morgagnus vascula sublingualium glandularum ostendere. Itaque intra breve tempus accepi duo testimonia Celeberrimorum Virorum, quorum Autographa apud me asservo, ita templa fideliter exscripta, eodem, modo ad meas manus venerunt, ordinem subjungo, ut non tantum mihi, sed etiam omnibus inservire possint, ut in historiâ Anatomiae verum astant, et scire cupiunt. Æquitatis enim vestræ fore, non dubito, hæc in vestris Actis edere eadem fide et candore, quo alienam interpretationem

F

edi-

edidistis, ut ex utroque hoc, quod subdo, tam gravi, tam certo, tam claro, non opinionum, aut argumentorum, sed factorum, atque Autopsiæ Testimonio, sublatis cunctis verborum et interpretationum tricis, planissime intelligere omnes queant, quis interpretando a vero aberraverit, et, quod caput est, quis primus Veros Sublinguales Ductus non iam supposuerit sed demonstraverit: Valete.

Testimonium Primum

CUM ineunte Anno MDCCVII Venetiis esset Illustrissimus D. Joan. Baptista Morgagnus, nunc in Patavino Gymnasio Primarius Anatomes Professor Celeberrimus, ac Præses, iam tum in ædibus Cl. Joannis Antonii Benevoli, repetitis ostensionibus, in ipsâ inferiore linguæ humanæ facie plures utrinque ductus, tenuioribus immixtis fetis, luculentissime demonstravit ex intima sublingualium glandularum substantiâ verè prodeuntes.

Quos ductus paulo post, et in publico Theatro nos quoque ostendimus

con

onjectâ in singulos tenui setâ, et
t rem certissimam ab illo usque tem-
ore nostri in Anatome Alumni cog-
overe Neque suspicati unquam fumus,
ios quam illos ipsos ductus descrip-
os esse a Præclarissimo Morgagno
advers: Anatom. VI postrema anim-
dversione verbis illis, *multoties com-
lura utrinque vascula* &c. D. Venetiis
XVII Kal. Aprilis MDCCXXV.

*Joannes Dominicus San-
torini, Magistratus Excel-
lentissimi Salutis Venetia-
rum Proto-Medicus et Pu-
blicus Anatom. Professor.*



Testimonium Secundum

AB Illustrissimo et Sapientissimo Vi-
ro D. Joanne Baptista Morgagno,
nostræ huius Inclytæ Academiæ Ana-
tomico Primario, et Præside, nun-
quam alia demonstrari vidi sublingua-
lium hominis glandularum vasa ex-
cretoria, quam quæ e lateribus ip-
sarum externis, id est, non ab illis,
quibus eæ glandulæ sese mutuo spec-
tant, sed ab illis, quibus spectant gin-
givas, in contiguam linguæ inferio-
rem faciem exeunt, et recta versus
gingivas, sed per eandem linguæ fa-
ciem tendunt ita, ut in eâdem linguæ
facie, non magno emenso spatio, sin-
gula osculum definant, tenuiorem se-
tam admittens. Nec mihi unquam
aut aliis, quod sciam, apud nos ve-
nit in mentem aliter accipere verba
illa ejusdem Celeberrimi Autoris, quæ
in fine VI Adversariorum leguntur:
multoties complura utrinque &c.

D: Patavii X Kal. Aprilis MDCCXXV

*Joannes Baptista Vulpus
in Patavinâ Universitate
Ordinarius Professor Pu-
blicus Anatomia.*

Res-

*Respondet apud nos alius
Anonymus.*

NEquē consultori Italo adstipulor, neque ad hac de re consultos accedo, qui eosdem se reperisse ductus, quos *Steno* et *Verheyenius* et post hos doctissimus *Morgagnus* viderat, confidenter asserunt, de nostri Autoris novis non solliciti. Sed quisquis est ille aliquot verborum Cl. Morgagni interpretres, qui tam diversa non discernit, vereor, ne, cum quadratis rotunda confundat: injurios autem nos in æquitatem tuam, Lector, fore credimus, si pluribus clarum facere contendimus, quod non ignorare te, debemus confidere: de veris certè sublingualibus ductibus recens in Germaniâ a se inventis te Autor plenius docet in Exercitatione, qua inventionis laudem meruit; sicut alii industriæ, et in agendo dexteritatis testimonio non fraudandi erunt. Ductus autem suos ad latus versus gingivas excurrentes, ab aliis hætenus non visos, non admitti ante, quam clarius descripserint, conspiciendosque

exhibuerint, eorum Autores non in
nique ferent.



Additamenta ad observationes de ductibus salivalibus sublingualium Glandularum, Exercitatione de Lingua Humana, et in Actis Mens. Jul. A. 1724 traditas; Autore Augustino Friderico Walthero, Archiatro Regio, Anatomes et Chirurgiæ Professore publico Lipsiensi. Ex Actis Eruditorum Lipsiensium Mensis Octobris MDCCXXVII. de sumta.

IRrigant os atque linguam ductus, quos Exercitatione peculiari sic exposuimus, ut canalibus, qui ante innotuerunt, adjiceremus plures, quos sublinguales promunt Glandulæ, quos olim deteximus, tum describere pleve-nius et enumerare suscepimus. La-porem inter inveniendum abbreviare solet eorundem orificiorum in tra-ctu sub linguâ positus, quem Exer-citatione annotavimus; ac ipsa na-turâ

turâ varias glandulas, variosque excretorios ductus impertivit, et nonnunquam omnes, aut saltem plurimi sine tædio temporisque dispendio investigantur; nec ægrè mediocrem stilum aliquando admittunt. Quare ad observationes, quas de ductibus sublingualibus antehac conscripsimus, nunc addere liceat, quod sectionum usu, et exercitio porro deprehendimus ac confirmavimus. Ab illo enim tempore permultorum publicè sectorum cadaverum humanorum, plurimumque privatim inspectorum, ac linguarum quidem glandularumque connexarum examine cognovimus admodum frequenter ex unâ glandulâ sublinguali quatuor provenire excretorios ductus, nec pauciores haberi: tamen interdum, et maximè in amplis ac elatis in ore glandulis singulis, eorum numerum uno alteroque augeri; quod ubi accidit, tum non positu, sed amplitudine ac longitudine plurimùm variare ductus solent.

Naturæ minime consuetum est, ad alterutrum et laterale linguæ in o-

re.

re , vinculum superaddere duos et solitis ampliores, aut ita aperiri in utroque latere numero dispares , quales hyeme anni præteriti vidimus, et ut illustretur de ductibus sublingualibus doctrina, nunc recensemus. Erant in cadavere senis publice secto admodum insignes sub linguâ glandulæ. Quarum excretorios ductus cum Auditoribus demonstraremus , sine multo labore sex a parte finistrâ, octo a dextrâ nec pares numero, omni quamvis adhibita diligentia invenire nobis dabatur.

Ex his sex anteriores ordine et positu in utroque latere inter se conveniebant; nihilominus cæteris conditionibus quodammodo diversi: at a dextrâ apertos duos posticos ductus, linguæque laterali vinculo vicinos, cum numerum excederent, et ab amplitudine *Warthoniani* ductus parum uterque abesset, stylumque digiti altitudine nec ægrè versus maxillarem glandulam ferret, ideo nostrâ investigatione accurata dignissimos hos existimavimus; præsertim cum in permultis cadaveribus et a pluribus an-

nis nullum sublingualis glandulæ ductum, cum maxillari glandula aut ejus excretorio ductu communicasse, experimentorum olim factorum memores, persuaderemur. Quam ob rem stilis in hosce canales illatis, ipsos et illæfos ab ostiis ad insertionum loca denudavimus, et totos plenius in conspectum produximus.

Ingrediebatur autem uterque insignis baccae uvæ instar crassam, et tenuioris productionis glandulæ sublinguali appendicem inconsuetam; quæ glandulæ maxillari, et reliquæ sublinguali cum interjecta esset, nihilominus dimidio digito ab ista finibus suis distabat, quamquam ambitu suo superius contegeret ductum *Warthonianum*,mersum cellulosa radicis linguae fauciumque membrana, quam exercitatione nostrâ annotavimus. Hoc corpus glandulæ nostræ appositum, et loco superadditum, quo in aliis subjectis ea finiri consuevit, et ubi loco consimili sinistra glandula desinebat, mole duas tertias partes ponderis reliquæ glandulæ ferre videbatur.

Nunc aërem per tubulum in utrum-

trumque immisimus ductum, et modo anteriorem modo posteriorem appendicis partem inde succuti et intumescere, more in aliis glandulis usitato animadvertimus.

Nec solum hi ductus ita distincti, sicut et glandulosum corpus, omnem aërem illatum in se continuerunt; sed et ipsi varios liquores et Mercurium vivum, quæ non ita multo post injecimus, prorsus concluderunt. Idem erat experimentis eventus, si-ve in situ nexuque hujus appendicis integro, si-ve cum eâ reclinata et a nexu cum vicinis, maximèque cum *Warthoniano* ductu separata esset, rerum periculum faceremus; quare nihil ex injectis nec ad maxillarem glandulam, nec ad *Warthonianum* ductum penetravit. Insignior et erat solitæque formæ major hujus lateris maxillaris glandula.

Etiam notabili ab hacce glandula globosâ intervallo, ad excretorium ductum accedebat mediocris magnitudinis ramus, qui, cum varia in truncum injiceremus, aliquid ex iis recipiebat. Et hoc observatu perarum est, ac in strumosis sæpius cognoscitur.

Nam

Nam mox pari modo alterum et oppositi lateris *Warthonianum* ductum exploravimus, et ipsum aliter ut experiremur, juxta papillam ligavimus: inde in altero ejus extremo et ad glandulæ corpus incidendo ipsum aperuimus, loco, ubi is ordinarie in ramos dividitur, et glandula mergitur. Hinc tubulo ad incisionem applicato, aëreque immisso, totum ductum et usque ad vinculum distendimus succussumusque: post infudimus aquam tinctam, tandem Mercurium vivum iniecimus; quæ cum moliremur, cecus res cecidit, ac cum talia in altero ductu ante experiremur. Omnia enim, quæ sic repetitis vicibus, illata fuerunt, ductus *Warthonianus* prorsus servavit et intra se continuit, sine eo, ut minor aliqua propago, aut, qui aliunde accederet ductus, sigillatim qui ad sublingualem glandulam pertineret, aliquid inde reciperet. Quæ modo retulimus experimenta, ea et ante anatomen illam sæpius, et pari cum successu tentavimus, maximèque cum pluribus linguis humanis glandulisque connexis, ut

info-

insolitam esse communionem pateret, alios Warthonios ductus, cerâ liquatâ injectâque plenos, alios Mercurio repletos, et ab omni commercio nexuque cum glandulis vasisque excretoriis sublingualibus aliisque ductibus liberos, in usum demonstrationum publicarum, adservandos curaremus. Hæc ita ad confirmandam amplificandamque de ductibus excretoriis distinctisque glandularum sublingualium doctrinam protulimus. Quos ductus alii in brutis, et aliter ac nos egimus, demonstrarunt ac delinearunt, nonnulli obscure et obiter eos notaverunt. Nam cum *Stenone* aut cum *Verheyeno*, de hominis ductibus sublingualibus sentire, ex unâ parte falsum ex alterâ ambiguum vexatumque est: vascula sibi invicem pallelata a lingua versus gingivas recedere, et sub intervallo digiti a dentibus ostiis suis per tunicam hiare, imo ad hanc doctrinam addere perinde erit: vascula ab exterioribus glandularum lateribus ad gingivas in transversum recedere, et non ita magno glandulis intervallo peculiari quodque osculo hiare,

re.“ Nam ista digiti intercapedo totam sublingualem glandulam complectitur, et medietatem linguæ in ore humano assequitur, ostiaque excretoriorum nostrorum verorumque ductuum ad dentes propius accedunt: contra, sub lingua levata glandula pro altitudinis suæ modo situque tantum admittere spatium omnino videtur, cum ea partim ad dentes et gingivas partim ad maxillam inferiorem, ac omnium denique altitudinem accommodatur. Ut igitur clarior res fiat, discernimus glandulæ utriusque et oblique positæ latera. Nam pro externis lateribus merito habemus, quæ sub involucro oris condita cum sunt, maxillæ inferiori, nunc ampliori factæ adnascuntur: at internis et superioribus suis lateribus, quidem in ore, tanquam angustiori spatio glandulæ prominent, linguæque sequuntur motum, et facile ad dentes adsurgunt, simul versus linguæ frenum excurrunt, ac, non nihil hoc loco inflexæ, quasi angulum constituunt. Proinde hæc latera in ore hominum distincta, nostrorum ductuum orificia videnda præbent, quæ ut explorentur in naturali om-

nium

nium situ atque in demortuorum linguis, ex ore resectis, id inter alia, Exercitatione citata docuimus. Unde tandem ab exterioribus glandularum lateribus ad gingivas in transversum quodque recedere sublinguale vasculum, et non ita magno a glandulis intervallo peculiari hiare osculo, quidem in brutis, icones testentur, quas *Steno* et *Diemerbroeck* delinearunt. Ceterum ad obscuros in re Autores *Bourdonus* atque *Diônis*, imo inter antiquos *Oribasius* accedere possunt: fin hujus verba, ad nostram doctrinam accommodare, ac interpretari, utcunque quis voluerit quando hic præ ceteris Lib. 24. Collect: Medicis scribit: “ Ad linguæ vinculum utrinque
“ ex obliquis partibus ora vasorum, quæ
“ salivam excipientia dicuntur invenies,
“ in quæ descendere stilus posset. In-
nitum ducunt hæc vasa ab radice lin-
guæ, ubi ejusdem quoque glandu-
læ sunt. Quare minus evidentem
paucorum opinionem reliqui Anato-
mici scriptores neglexerunt, doctri-
namque amplexi fuerunt, in homine
licet minus probatam de singulo sub-
lingualis

lingualis glandulæ excretorio ductu
Rivini, et *Bartholini*, sive distincto, si-
ve cum *Warthoniano* connexo: ut
videre est apud *Ruyschium*, *Bidloo-*
um, *Munnickium*, *Taurium*, *Dra-*
kium, *Welschium*, *Cheseldenium*,
Keilium, *Heisterum*, *Noguesium*,
et reliquos.



BERIGT VOOR DEN
B O E K - B I N D E R.

De Platen moeten alle na malkan-
deren volgen, en op pag: 78. zo geschikt
worden, dat de zelve buiten het boek uitslaan.